



DEUTSCHE SCHULE BARCELONA
KINDERGARTEN

COLEGIO ALEMAN DE BARCELONA
PARVULARIO

Jacint Esteva Fontanet, 105
E-08950 Esplugues de Llobregat

Tel. 933 718 300
Fax 934 733 927

Liebe Eltern,

in der Gruppe Ihres Kindes sind ein oder mehrere Fälle von Scharlach aufgetreten. Es handelt sich um eine bakterielle Erkrankung des Kindesalters, die meist mit einem Hautausschlag verläuft und gut behandelbar ist.

Krankheitsinformation:

1. Scharlach ist unter Kindern im Kindergarten- und Vorschulalter sehr verbreitet. Die Erreger, die Scharlach verursachen, sind Bakterien (Streptokokken). Streptokokken zählen zu den häufigsten Erregern bakterieller Infektionen im Kindesalter.
2. Die **Verbreitung** der Krankheit erfolgt durch Tröpfchen – also Niesen, Husten oder Speichel –, andererseits aber auch durch verunreinigte Gegenstände (Hände, Besteck, Spielzeug).
3. Die ersten **Krankheitszeichen** treten 2 bis 7 Tage nach der Ansteckung auf. Eine Scharlacherkrankung beginnt plötzlich mit Halsschmerzen, Schluckbeschwerden, geröteten Wangen, Schüttelfrost, Erbrechen, Kopf- und Gliederschmerzen, Abgeschlagenheit und oft hohem Fieber. Häufig klagen die Patienten auch über heftige Bauchschmerzen. Zwischen dem 2. und 4. Tag erscheint auch der feinfleckige, samtartige Scharlach-Ausschlag. Die hirsekorn- bis stecknadelkopfgroßen roten Flecken beginnen meist in der Leistenregion und an den Innenseiten der Oberschenkel und breiten sich dann über den gesamten Körper aus, nur das Mund-Kinn-Dreieck bleibt ausgespart.
4. **Therapie:** Wegen der Gefahr von Folgeerkrankungen an Ohren, Gelenken, Herz und Nieren sollte bei einem Verdacht auf Scharlach immer ein Arzt hinzugezogen werden! Die Behandlung erfolgt üblicherweise mit Antibiotika.
5. Sollte Ihr Kind eines der obengenannten Symptome zeigen, sollte Ihr Kind dem Kinderarzt vorgestellt werden.
6. Die **Ansteckungsgefahr** besteht bis zu 24 Stunden nach Beginn einer erfolgreichen Antibiotikabehandlung. Wird auf eine Behandlung mit Antibiotika verzichtet, so verlängert sich die Ansteckungsgefahr bis zum Abklingen der Symptome noch ca. 3 Wochen.
7. Vorbeugungs-Prophylaxe: nicht möglich, kein Impfstoff verfügbar.
8. Eine **Wiederezulassung** zum Kindergarten kann bei einer Antibiotikatherapie und ohne Krankheitszeichen ab dem zweiten Tag erfolgen, ohne Therapie nach zum Abklingen der Krankheitssymptome (3 Wochen). Ein schriftliches ärztliches Attest ist im Allgemeinen nicht erforderlich.

Mit freundlichen Grüßen aus dem Kindergarten

Weitere Informationen unter www.kinderaerzte-im-netz.de (Krankheiten A-Z, Scharlach)
Hinweise ersetzen nicht die fachärztliche Beratung und sind ohne Anspruch auf Vollständigkeit.